

# Rupture aiguë d'un kyste hydatique foie dans la plèvre droite

## À propos de deux observations

Riadh Bel Haj Salah\*, Wissem Triki, Mohamed Belgacem Bourguiba,  
Mounir Ben Moussa, Abdeljelil Zaouche

### RÉSUMÉ

Mots clés : kyste hydatique, foie, plèvre, tomodensitométrie, thoracotomie.

La localisation hépatique est la plus fréquente atteinte hydatique. L'ouverture d'un kyste hydatique du foie dans le thorax, et en particulier dans la cavité pleurale, est rare et grave. Nous rapportons deux observations de rupture aiguë d'un kyste hydatique du foie dans la plèvre droite. La première correspond à un tableau clinique et radiologique typique et a eu une prise en charge conventionnelle. La deuxième n'a été diagnostiquée qu'en peropératoire et a eu une approche thérapeutique originale.

### ABSTRACT

Keywords: hydatid cyst, liver, pleura, computed tomography, thoracotomy.

Liver is the most frequent location of hydatid cyst. Thoracic and particularly pleural rupture of hydatid liver cyst is rare and a lifethreatening complication. We report two cases of acute rupture of hydatid cyst of the liver in the right pleura. The first showed classic clinic and radiologic signs and standard therapeutic approach. The second was recognized once operated with diagnosis of non complicated hydatid cyst of the liver and the peritoneum. It required an original therapeutic approach.